

Centro auditivo especializado en Zaragoza

En **tus oídos** hemos desarrollado un método de **adaptación de audífonos** fruto de la experiencia y el trabajo en equipo con las principales asociaciones nacionales e internacionales de audioprotesistas.

Si empieza a tener **problemas de comunicación, entendimiento o falta de capacidad para oír determinados sonidos, venga a vernos ya**, no olvide que adaptamos los audífonos para oír y entender bien y para frenar en la medida de lo posible el avance progresivo de su sordera.

Nuestro equipo de profesionales dispone de la más moderna tecnología para la correcta adaptación de audífonos de los principales fabricantes.

DESCUBRA NUESTROS SERVICIOS EXCLUSIVOS

Revisión gratuita de la audición
Prueba gratuita y (sin compromiso de compra de sus audífonos)
Financiación a su medida
Garantía hasta 5 años
Seguro contra pérdida, robo o rotura
Revisiones periódicas y limpieza gratuita
Reparación todas las marcas



 **tus oídos** centros
auditivos
Av. Compromiso de Caspe, 23, local
Tel. 976 411 470 • 50002 Zaragoza

www.audifonosenzaragoza.es | síguenos en  [tusoidos](#)

 **tus oídos** centros
auditivos
Av. Compromiso de Caspe, 23, local
Tel. 976 411 470 • 50002 Zaragoza

La hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva de un sujeto, en mayor o menor grado. Afecta al 25-40% de los mayores de 65 años y al 80% de los mayores de 85 años. Según el volumen de la pérdida auditiva, la hipoacusia se clasifica en: ligera (30-70 dB), media (71-85 dB) o grave (mayor de 86 dB).

En función de la localización de la lesión, las hipoacusias pueden ser de tres tipos:

Hipoacusia neurosensorial o de percepción: la lesión se localiza en la cóclea y en la vía nerviosa. Son las más frecuentes y suelen ser irreversibles.

Hipoacusia transmisiva o de conducción: el origen de la lesión se encuentra en el oído externo y medio. La mayoría son potencialmente curables.

Hipoacusia mixta: Existe un deterioro de los umbrales obtenidos por la vía ósea en una o varias frecuencias, y de otro lado, los umbrales obtenidos por vía aérea también están deteriorados, pero lo están en mayor medida que los correspondientes a la vía ósea. Existe un Gap óseo-aéreo abierto en una o varias frecuencias. Afecta por un lado a la conducción del sonido (problema en oído externo y/o medio) y por otro, a una afección del estrato neurosensorial del oído.

Nuestro método

Aquí le indicamos los pasos que seguimos hasta la correcta adaptación de los audífonos:


En primer lugar, dedicamos un buen tiempo en hablar con el paciente y sus familiares para conocer los antecedentes de la persona y, sobre todo, los problemas reales que a él le ocasiona la falta de audición. Así como para descubrir si existen patologías asociadas.

A continuación realizamos toda una batería de pruebas clínicas para diagnosticar correctamente el problema (otoscopia, audiometrías por vía aérea y ósea, impedanciometría y logaudiometría).

En función de todos estos datos elegimos, junto con el paciente y



Anatomía del oído



vistas sus necesidades, los audífonos más apropiados para solucionar su problema.

Adaptamos los audífonos en sucesivas sesiones personalizando los mismos y llegando a obtener la totalidad de sus prestaciones. Es entonces, y solo entonces, cuando el paciente decide la compra de los mismos. Este proceso puede prolongarse durante un mes.