Cambios observados en el sistema climático

Concentración de CO₂ atmosférico durante los tres últimos ciclos glaciares a partir de testigos de hielo

PROXY (INDIRECT) MEASUREMENTS

Data source: Reconstruction from ice cores.
Credit: NOAA

desde hace 250 años

All Figures © IPCC 2013

Carbon Dioxide

LATEST MEASUREMENT: August 2016

404.07 ppm

LATEST MEASUREMENT: December 2017

407.62 ppm

Atmospheric concentrations of carbon dioxide (CO₂)

LATEST MEASUREMENT: May 2018

408 ppm

DIRECT MEASUREMENTS: 2005-PRESENT

Data source: Monthly measurements (average seasonal cycle removed). Credit: [NOAA](#)

≈39% > than the last 800.000 years

LATEST MEASUREMENT: April 2019

411 ppm

Click+drag to zoom

RESET

Get Data: [FTP](#) | Snapshot: [PNG](#)

Múltiples indicadores observados de cambio global en el ciclo del carbono

All Figures © IPCC 2013

Concentración de CO₂ atmosférico medido en dos estaciones

Carbon Dioxide

LATEST MEASUREMENT: August 2016

404.07 ppm

LATEST MEASUREMENT: December 2017

407.62 ppm

LATEST MEASUREMENT: May 2018

408 ppm

≈39% > últimos 800.000 años

Presión parcial de CO₂ disuelto en la superficie del océano

pH medido en el océano

Cambio observado en la temperatura superficial 1880-2019

Source: climate.nasa.gov

2016 el más caluroso en el registro histórico

18 de los 19 más calurosos en el registro se han producido desde 2001

LATEST ANNUAL AVERAGE ANOMALY: 2018

0.8 °C

Anomalía global media de la temperatura superficial de la tierra y el océano observada entre 1880-2018 con respecto a la media del periodo 1951-1980

Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1880.

En el hemisferio norte, es probable (>66%) que 1983–2012 fuera el período de 30 años más cálido de los últimos 1400 años (nivel de confianza medio).

Cambio observado en la temperatura superficial 1901-2012

All Figures © IPCC 2013

Efecto de los cambios en la distribución de la temperatura sobre los extremos.

- (a) Cambios en la media
- (b) Cambios en la variabilidad sin cambio en la media
- (c) Cambios en la simetría

Figures © SREX Report IPCC

All Figures © IPCC 2013

Energía acumulada en ZJ (1 ZJ=10²¹ J) en los diferentes componentes del sistema climático terrestre entre 1971 y 2010

(Garofía 1966!)

- Upper ocean (0-700 m) (93% del total)
- Deep ocean (700 m-2000 m)
- Ice (glaciares, masas de hielo, Groenlandia, Ártico y Antártida)
- Land (suelo de los continentes)
- Banda de confianza del 90%

En los últimos 40 años se han acumulado 70 m Twh

Calentamiento continuo de 0,42 W/m² de toda la superficie terrestre

500x más que el consumo energético anual en el mundo

150.000x la producción de Almaraz en el mismo periodo

SATELLITE DATA: 1993-PRESENT

Data source: Satellite sea level observations.
Credit: NASA Goddard Space Flight Center

RATE OF CHANGE

↑ 3.3

millimeters per year

Sea Height Variation (mm)

LATEST MEASUREMENT: February 2019

91 (± 4) mm *i*

Cambio en el nivel medio del mar desde 1993 (saté

GROUND DATA: 1870-2013

Data source: Coastal tide gauge records.
Credit: [CSIRO](#)

El aumento del nivel medio del mar se debe a dos factores producidos por el calentamiento global: la expansión volumétrica del agua del océano y el incremento de volumen de agua proveniente de glaciares y masas de hielo en el continente.

Datos de aumento del nivel medio del mar (global) desde 1870-2013 obtenidos de

Cambio en el nivel medio del mar global observado desde 1880 y 1992

All Figures © IPCC 2013

(c)

Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los dos milenios anteriores (nivel de confianza alto). Durante el período 1901-2010, el nivel medio global del mar se elevó 0,19 metros [0,17 a 0,21 metros].

LATEST MEASUREMENT: February 2018

87 (± 4) mm

desde 1993

LATEST MEASUREMENT: June 2016

86.2 mm

RATE OF CHANGE

↑ 3.2

millimeters per year
margin: ± 0.4

Multi-Mission Sea Level Trends

Period: Jan-1993 to May-2017

© CNES/LEGOS/CLS, 2017

Cambios observados en el sistema climático

El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado.

1931 Alberto De Agostni - © Museo Borgatello

2016 Fabiano Ventura - © Archivio fabianoventura.it

10 años de I+D+i pc

REFUGIADOS CLIMÁTICOS

10 años de I+D+i para un desarrollo s

400 Alaskan villagers are set to be the U.S.'s first climate change refugees

Patrones globales de los impactos en los últimos decenios atribuidos al cambio climático

El futuro del cambio climático

Trayectorias de forzamientos radiativos

Futuros diferentes

Cambios en la temperatura superficial media global

All Figures © IPCC 2013

Mapas de la media de los resultados de los modelos del CMIP5

All Figures © IPCC 2013

Aumento del nivel medio del mar global

All Figures © IPCC 2013

Incremento de temperatura y emisiones de carbono acumuladas

All Figures © IPCC 2013

De 1870 a 2014,
emisiones acumuladas
totales: ≈ 545 GtC

Valor medio anual
actual ≈ 10 GtC

20-25 años para 2°C

TRACKING
GLOBAL
CLIMATE
ACTION
SINCE 2009

About Climate Action Tracker (CAT)

The Climate Action Tracker (CAT) is an independent scientific analysis produced by three research organisations tracking climate action since 2009. We track progress towards the globally agreed aim of holding warming well below 2°C, and pursuing efforts to limit warming to 1.5°C.

FIND OUT MORE >

El futuro del cambio climático

Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán un mayor calentamiento y nuevos cambios en todos los componentes del sistema climático. Para contener el cambio climático, será necesario reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones.

Más impactos

Mayores riesgos

Adaptación

Nuevas oportunidades

LA LUCHA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

MITIGACIÓN

Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los *sumideros* de gases de efecto invernadero.

ADAPTACIÓN

Proceso de ajuste al *clima* real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al *clima* proyectado y a sus efectos.

(IPCC, 2014)

Mitigación vs Adaptación

OBJETIVOS POR DEFINIR:
Horizonte
Neutralidad de carbono
Cero emisiones
Sendas de descarbonización

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

SISTEMAS NATURALES—SISTEMAS SOCIOECONÓMICOS

RIESGOS FÍSICOS POR EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS SOBRE SISTEMAS NATURALES Y SOCIOECONÓMICOS
AGUDOS POR EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS
CRÓNICOS POR EFECTOS DE LARGO PLAZO

OPORTUNIDADES
MEJORA AMBIENTAL
EFICIENCIA DE RECURSOS
NUEVAS FUENTES ENERGÉTICAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS/PRODUCTOS/SERVICIOS
NUEVOS MERCADOS
INCREMENTO DE LA RESILIENCIA

RIESGOS PRODUCTO DE LA TRANSICIÓN
CAMBIOS EN POLÍTICAS Y LEGALES
TECNOLÓGICOS
DE MERCADO
REPUTACIONALES

CONSECUENCIAS

AMBIENTALES
SOCIALES
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS