

# Caiño Tinto



## Ampelografía

### Sumidad:

*Apertura extremidad* Completamente abierta

*Pelos postrados de la extremidad* Pigmentación débil  
Densidad muy alta

### Pámpano:

*Color entrenudo* Verde con rayas rojas en la cara dorsal  
Verde en la cara ventral

*Color nudo* Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal  
Verde en la cara ventral

*Densidad pelos tumbados* Bajas en nudos  
Media en entrenudos

### Hoja joven:

*Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales* Débil

*Densidad pelos tumbados* Densa entre nudos  
Media sobre nervios

### Hoja adulta:

*Tamaño del limbo* Grande

*Forma del limbo* Pentagonal

*Número de lóbulos* Cinco

*Disposición lóbulos del seno peciolar* Ligeramente-medio superpuestos

*Hinchazón del haz* Media

*Perfil en sección transversal* Plano

*Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores* Profundidad superficial con lóbulos abiertos



*Pigmentación del haz* Débil

*Densidad pelos tumbados entre nervios principales* Media-alta


*Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales* Baja

*Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo* Peciolo igual al nervio central con densidad baja de pelos tumbados

*Forma y longitud de dientes* Dientes con ambos lados convexos de longitud cortos con relación longitud-anchura pequeña



# Caiño Tinto



## **Racimo:**

<i>Tamaño</i>	Pequeño
<i>Compacidad</i>	Compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

## **Baya:**

<i>Tamaño</i>	Pequeña-media
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Negra-azul
<i>Forma del perfil</i>	Elíptica ancha-circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Herbáceo
<i>Formación pepitas</i>	Bien formadas

## **Sarmiento:**

<i>Color</i>	Marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Estrada

## **Fenología:**

**Época de desborre:** precoz

**Época de maduración:** media-tardía

## **Aptitudes agronómicas:**

- Variedad muy productiva de porte horizontal.
- Resiste a la sequía. Bien adaptada a terrenos poco fértiles. Admite podas cortas. Exigente en potasio. En zonas frescas no madura correctamente.
- Muy sensible al Oidio. Poco sensible a Botrytis y Excoriosis.

## **Potencial enológico:**

- Vinos alcohólicos con bastante color, carentes de fruta y suavidad. Taninos astringentes, herbáceos y amargos.
- Mejores resultados con la técnica de maceración carbónica gracias a su alta acidez y al desarrollo de aromas jóvenes típicos. En zonas poco fértiles, con viñas adultas y producciones limitadas se obtienen vinos de calidad.

