


Garnacha Tinta



Origen

- Variedad de origen español, probablemente de la región de Aragón. Bastante extendida por todo el mundo. El conocimiento de esta variedad se remonta a la época de la ocupación árabe.

Sinonimias

- Gironet, Grenache, Lladoner, Roussillon, Tinto Aragonés.

Fenología (variedad referencia Chasselas)

- Época de desborre: media.
- Época de maduración: media.

Ampelografía

SUMIDAD			
	<i>Apertura extremidad</i>		<i>Abierta</i>
	<i>Pelos postrados extremidad</i>	<i>Pigmentación</i>	<i>Media-muy alta</i>
		<i>Densidad</i>	<i>Débil</i>
PÁMPANO			
	<i>Color entrenudo</i>	<i>Cara dorsal</i>	<i>Verde</i>
		<i>Cara ventral</i>	<i>Verde</i>
	<i>Color nudo</i>	<i>Cara dorsal</i>	<i>Verde</i>
		<i>Cara ventral</i>	<i>Verde</i>
	<i>Densidad pelos tumbados</i>	<i>En nudo</i>	<i>Nula o muy baja</i>
		<i>En entrenudo</i>	<i>Nula o muy baja</i>
HOJA JOVEN			
	<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>		<i>Débil</i>
	<i>Densidad pelos tumbados</i>		<i>Nula- muy débil</i>
HOJA ADULTA			
	<i>Tamaño limbo</i>		<i>Medio</i>
	<i>Forma del limbo</i>		<i>Pentagonal</i>
	<i>Número de lóbulos</i>		<i>Cinco</i>
	<i>Disposición de lóbulos del seno peciolar</i>		<i>Abierto, en lira</i>
	<i>Hinchazón del haz</i>		<i>Débil</i>
	<i>Perfil en sección transversal</i>		<i>Alabeados</i>
	<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>		<i>Profundidad superficial con lóbulos cerrados-superpuestos</i>
	<i>Pigmentación del haz</i>		<i>Nula</i>
	<i>Densidad entre nervios principales</i>	<i>Pelos tumbados</i>	<i>Nula o muy baja</i>
		<i>Pelos erguidos</i>	<i>Nula o muy baja</i>
	<i>Densidad pelos sobre el peciolo</i>		<i>Nula o muy baja</i>
	<i>Forma de dientes</i>		<i>Rectilíneos</i>
	<i>Longitud dientes</i>		<i>Longitud media, relación longitud-anchura media</i>
RACIMO			
	<i>Tamaño</i>		<i>Pequeño- mediano</i>
	<i>Compacidad</i>		<i>Compacto- muy compacto</i>
	<i>Longitud pedúnculo</i>		<i>Corto</i>
BAYA			
	<i>Tamaño</i>		<i>Medio</i>
	<i>Uniformidad tamaño</i>		<i>Uniforme</i>
	<i>Color epidermis</i>		<i>Rojo-violeta oscuro</i>
	<i>Forma perfil</i>		<i>Esférica</i>
	<i>Separación pedicelo</i>		<i>Difícil</i>
	<i>Grosor piel</i>		<i>Fina</i>
	<i>Pigmentación pulpa</i>		<i>Ausente</i>
	<i>Consistencia pulpa</i>		<i>Blanda</i>
	<i>Suculencia pulpa</i>		<i>Jugosa</i>
	<i>Sabores particulares</i>		<i>Ninguno</i>
	<i>Formación pepitas</i>		<i>Presentes</i>
SARMIENTO			
	<i>Color</i>		<i>Marrón</i>
	<i>Relieve superficie</i>		<i>Estriada</i>

Características agronómicas


- Planta muy vigorosa, porte erguido.
- Fertilidad alta. Producción entre media y alta, racimos entre medianos y grandes.

- Planta muy resistente a la sequía, muy versátil, se adapta a todo tipo de suelos. Se adapta a poda corta aunque tampoco va mal con poda larga.
- Sensible a mildiu, botrytis y al corrimiento de racimo.


Potencial enológico

- Vinos alcohólicos, color granate, aromas ligeros con tonos de fruta roja madura, acidez media-alta, vino poco estructurado.
- Se emplea para crianzas en ensamblaje con Tempranillo, Cabernet, Macabeo, Syrah y Graciano. Como vino joven no es interesante por su rápida oxidación. Su mayor vocación es la elaboración de rosados a partir de monovariales de Garnacha.

Hoja (haz y envés) y pámpano joven



Racimo



Distribución geográfica

